






NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA FASOLA / GROCH

<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 8.18.45</p> <p>lecitec 1,0 L/ha**</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> 	<p>MC SET 2x1,5 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p> <p>Calcio-Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> 	<p>MC CREAM 2x2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45</p> <p>Calcio-Sprint 5 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> 
<p>Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych i związanych ze stosowaniem herbicydów.</p>	<p>Stymulowanie prawidłowego rozwoju roślin. Kendal stymuluje naturalną odporność roślin.</p>	<p>Przygotowanie rośliny do kwitnienia. Lecitec stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi.</p>	<p>Przewyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie powstawaniu niedoborów makro i mikroelementów. MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, zapobiega opadaniu zawiązków.</p>	<p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Calcio Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia.</p>
<p>Faza 3-5 liści właściwych</p>	<p>Rozwój pędów bocznych</p>	<p>Rozwój kwiatostanów</p>	<p>Kwitnienie</p>	<p>Rozwój/wzrost strąków</p>

* Niższą dawkę Megafol 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. Megafol poprawia ich skuteczność i szybkość działania.

Wyższą dawkę Megafolu 2,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad. Megafol zastosowany 4 i 2 tyg. przedzbiorem w dawce 2,0 L/ha zmniejsza zawartość azotanów.

** LECITEC stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi. Zaleca się 2-3 zabiegi w sezonie. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

Uzupełniające nawożenie dogłębne:

VIVA 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

IBE RHUMUS 2,5-5,0 kg/ha na początku vegetacji. Dawkę 2,5 kg można stosować dwukrotnie.