





NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA BURAK CUKROWY

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 1,5-2,0 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,15-0,25 L/ha</p> <p>Cuperdem 1,5L/ha***</p>  <p>Zapobieganie wystąpieniu niedoborów makro i mikroelementów. Wspomaganie wzrostu i optymalizacja długości korzenia. Zwiększenie skuteczności zabiegu i przetrwanie skutków stresu roślin po zabiegu herbicydowym (zabieg łącznie z herbicydem).</p>	<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>MC CREAM 2 x 2,0 L/ha</p> <p>Enermax 2x0,5 kg/ha</p> <p>Cuperdem 1,5-2,5 L/ha***</p>  <p>Zapobieganie wystąpieniu niedoborów makro i mikroelementów. Wspomaganie wzrostu korzenia spichrzowego. Zwiększenie skuteczności zabiegu i przetrwanie skutków stresu roślin po zabiegu herbicydowym (zabieg łącznie z herbicydem). MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływa na podziały komórkowe. ECKOSIL poprawia odporność roślin na choroby, szkodniki i suszę.</p>	<p>PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5kg/ha</p> <p>KENDAL 2,0-2,5 L/ha</p> <p>Ca Sprint 5 L/ha**</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p>  <p>Wspomaganie wzrostu korzenia spichrzowego.</p> <p>Kendal: Stymulowanie naturalnej odporności rośliny na choroby grzybowe.</p> <p>Ca Sprint: ogranicza niedobory wapnia, które skutkują chlorozami liści.</p>
<p>4-8 liści BBCH 3-21</p>	<p>Przed zakryciem międzyrzędzi BBCH 22-31</p>	<p>Wzrost korzenia BBCH 32-39</p>

* Niższą dawkę MEGAFOL-u 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungycydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad. MEGAFOL zastosowany 4 i 2 tyg. przed zbiorem w dawce 2,0 L/ha zmniejsza zawartość azotanów.

** CA SPRINT ogranicza niedobory wapnia w roślinie, które skutkują chlorozami liści.

*** Cuperdem jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku wegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku wegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.