





NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA BURAKÓW CIEKLI

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>MEGAFOL 1,0-2,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Wspomaganie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny. Przewyciężenie stresów środowiskowych i związanych ze stosowaniem herbicydów.</p>	<p>MEGAFOL 1,0-2,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>Stymulowanie prawidłowego rozwoju roślin. Zapobieganie powstawaniu niedoborów makro i mikroelementów. Eckosil poprawia odporność rośliny na choroby, szkodniki i suszę. Podnosi masę i jędrność plonu.</p>	<p>MC CREAM 2x2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Zapobieganie powstawaniu niedoborów makro i mikroelementów.</p>	<p>PLANTAFOL 2,0-2,5kg/ha 5.15.45 lub 0.25.50</p> <p>Lecicrop 1,0 L/ha**</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p>  <p>Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze. Lecicrop stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi.</p>
<p>2-4 liści właściwych</p>	<p>Powyżej 6 liści właściwych</p>	<p>Wzrost korzeni, kumulowanie materiałów zapasowych w korzeniach</p>	<p>Wzrost korzenia</p>

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad. MEGAFOL zastosowany 4 i 2 tyg. przed zbiorem w dawce 2,0 L/ha zmniejsza zawartość azotanów.

** LECICROP stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi. Zaleca się 2-3 zabiegi w sezonie. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.