






# NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA CZEREŚNIA / WIŚNIA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p><b>MEGAFOL</b> 1,0-2,0L/ha*</p> <p><b>PLANTAFOL</b> 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> <p><b>KENDAL</b> 1,5-2,0 L/ha</p> 	<p><b>MEGAFOL</b> 1,0-3,0L/ha*</p> <p><b>PLANTAFOL</b> 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20</p> <p><b>MC SET</b> 2x2,0 L/ha</p> <p><b>Enermax</b> 2x0,5 kg/ha</p> <p><b>Cuperdem</b> 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p><b>MC CREAM</b> 2x2,0 L/ha</p> <p><b>PLANTAFOL</b> 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45</p> <p><b>Ca Sprint</b> 5,0 L/ha</p> <p><b>Lecicrop</b> 1,5-2,5 L/ha**</p> <p><b>Eckosil</b> 0,5 L/ha</p> <p><b>Cuperdem</b> 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p><b>MEGAFOL</b> 1,0-3,0/ha*</p> <p><b>PLANTAFOL</b> 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45 lub 0.25.50</p> <p><b>Ca Sprint</b> 5,0 L/ha</p> <p><b>Lecicrop</b> 1,5-2,5 L/ha**</p> <p><b>Eckosil</b> 0,5 L/ha</p> <p><b>Cuperdem</b> 2,0-2,5 L/ha***</p> 
<p>Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych. Stymulowanie naturalnej odporności rośliny.</p>	<p>MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, poprawia zawiązywanie owoców i zapobiega opadaniu zawiązków.</p>	<p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze. Eckosil poprawia właściwości przechowalnicze plonu podnosząc jego jędrność masę.</p>	<p>Lecicrop jako alternatywne rozwiązanie ochrony przed chorobami grzybowymi, zapobiega pękaniu i poparzeniom słonecznym, wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie oraz zapobiega utracie wody podczas przechowywania.</p>
<p><b>Biały pąk</b></p>	<p><b>Kwitnienie</b></p>	<p><b>Wzrost zawiązków</b></p>	<p><b>Dojrzewanie owoców</b></p>

\* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungicydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0-3,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

\*\* LECICROP stosować w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i chorobami grzybowymi. Jednocześnie wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie, zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wody podczas opadów oraz poprawia właściwości przechowalnicze i transportowe. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

\*\*\* CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

## Uzupełniające nawożenie dogłębowe:

**VIVA** 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

**HUMIFLOW** 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

**RADIFARM** 250ml/100 L wody moczenie sadzonek przed posadzeniem, podlewanie po posadzeniu. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.