




NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA KUKURYDZA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 1,5-2,0 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 1,5L/ha**</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 1,5-2,5 L/ha**</p> <p>Humiflow 3,0-5,0 L/ha***</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha</p> 
<p>Wspomaganie wzrostu i rozwoju rośliny. Zwiększenie skuteczności zabiegu i przezwyciężenie skutków stresu roślin po zabiegu herbicydowym (zabieg łącznie z herbicydem). Zapobieganie wystąpieniu niedoborów makro i mikroelementów.</p>	<p>Zwiększenie wielkości i jakości plonu oraz przezwyciężenie skutków stresów. ECKOSIL poprawia odporność roślin na choroby, szkodniki i suszę.</p>	<p>Zwiększenie wielkości i jakości plonu oraz przezwyciężenie skutków stresów.</p>
<p>3-5 liści BBCH 13-15</p>	<p>6-9 liści BBCH 16-19</p>	<p>Rozwój źdźbła BBCH 25-39</p>

UWAGA ! Nie stosować łącznie z herbicydami na bazie nikosulfuronu, foramsulfuronu i jodosulfuronu.

* Niższą dawkę MEGAFOL-u 1,0 l/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungycydami, herbicydami, insektycydami i nawozami. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania.

Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

*** HUMIFLOW zastosowany dolistnie poprawia zawartość białka w ziarnie i wpływa korzystnie na plonowanie.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku wegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku wegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.