






NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA OGÓREK / CUKINIA / DYNIA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>MEGAFOL 1,0-2,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 10.54.10</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 20.20.20</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45</p> <p>Lecicrop 1,0 L/ha**</p> <p>MC SET 2x1,5 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p> 	<p>MC CREAM 2x2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 2,0-2,5 kg/ha 5.15.45 lub 0.25.50</p> <p>Lecicrop 2x1,5 L/ha**</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p> 
<p>Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych i związanych ze stosowaniem herbicydów.</p>	<p>Stymulowanie prawidłowego rozwoju roślin. Lecicrop stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi.</p>	<p>Przewyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie powstawaniu niedoborów makro i mikroelementów. MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, zapobiega opadaniu zawiązków.</p>	<p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechwalnicze.</p>
<p>Po wysadzeniu rozsady (po osiągnięciu rozmiaru standardowej rozsady)</p>	<p>W trakcie wzrostu rośliny</p>	<p>Początek kwitnienia</p>	<p>Wzrost i pierwszy zbiór plonu</p>

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad. MEGAFOL zastosowany 4 i 2 tyg. przed zbiorem w dawce 2,0 L/ha zmniejsza zawartość azotanów.

** LECICROP stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi. Zaleca się 2-3 zabiegi w sezonie. Stosować w stężeniu 0,3-0,5%, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

RADIFARM 250ml/100 L namaczanie lub podlewanie rozsady przed wysadzeniem. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.