







NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA POMIDOR / PAPRYKA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>Prawidłowy start i rozwój vegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.</p>	<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>MC SET 2x1,5 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>MC set zastosowany na każde kwitnące grono, poprawia zawiązywanie owoców, zapobiega opadaniu zawiązków. Kendal stymuluje naturalną odporność rośliny.</p>	<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Enermax 2x0,5 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>Stymulowanie prawidłowego zawiązywania owoców. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.</p>	<p>MC CREAM 2x2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Lecicrop 1,0 L/ha**</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Lecicrop ogranicza pęknięcie owoców i poparzenia słoneczne.</p>	<p>MEGAFOL 1,0-2,0/ha*</p> <p>PLANTAFOL 5.15.45 lub 0.25.50 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>SWEET 2,0-3,0 L/ha</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5L/ha***</p>  <p>Przewyciężenie stresów środowiskowych. Sweet przyspieszenie dojrzewanie, poprawia wybarwienie, smak i właściwości przechwalnicze plonu.</p>
<p>W trakcie wzrostu rośliny</p>	<p>Początek kwitnienia</p>	<p>Wiązanie owoców</p>	<p>Wzrost owoców</p>	<p>Dojrzewanie owoców</p>

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad. MEGAFOL zastosowany 4 i 2 tyg. przed zbiorem w dawce 2,0 L/ha zmniejsza zawartość azotanów.

** LECICROP stosować jako alternatywne rozwiązanie do ochrony przed chorobami grzybowymi. Zaleca się 2-3 zabiegi w sezonie. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakterijnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

RADIFARM 250ml/100 L namaczanie lub podlewanie rozsady przed wysadzeniem. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.

VIVA 10L/ha na początku vegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku vegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.