







NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA TRUSKAWKA

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

<p>MEGAFOL 1,0-2,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 30.10.10 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-3,0L/ha*</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>KENDAL 1,5-2,0 L/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p>MC SET 2x1,5 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 10.54.10 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Enermax 2x0,5 kg/ha</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p>MC CREAM 2x2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 5.15.45 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Lecicrop 2,0 L/ha**</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> <p>Cuperdem 2,0-2,5 L/ha***</p> 	<p>MEGAFOL 1,0-2,0 L/ha</p> <p>PLANTAFOL 5.15.45 lub 0.25.50 2,0-2,5 kg/ha</p> <p>SWEET 2,0 L/ha</p> <p>Ca Sprint 5,0 L/ha</p> <p>Lecicrop 2,0 L/ha**</p> <p>Eckosil 0,25-0,5 L/ha</p> 
<p>Prawidłowy start i rozwój wegetacji. Przewyciężenie stresów środowiskowych. Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych.</p>	<p>Stymulowanie naturalnej odporności roślin. Zapobieganie wystąpienia niedoborów składników pokarmowych.</p>	<p>MC Set stymuluje i wydłuża kwitnienie, poprawia zawiązywanie owoców i zapobiega opadaniu zawiązków. ENERMAX stosować na koniec kwitnienia, na początku zawiązywania owoców.</p>	<p>MC Cream podnosi jakość i wielkość plonu, wpływając na proces fotosyntezy. Lecicrop wspomaga ochronę przed chorobami, ogranicza pękanie owoców, poparzenia słoneczne oraz zapobiega utracie wody podczas przechowywania.</p>	<p>Sweet zalecany w przypadku odmian deserowych w celu poprawienia smaku i jakości owoców. Ca Sprint ogranicza powstawanie niedoborów wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze.</p>
<p>Początek wegetacji</p>	<p>Przed kwitnieniem</p>	<p>W trakcie kwitnienia</p>	<p>Po zawiązaniu pierwszych owoców</p>	<p>Dojrzewanie owoców</p>

* Niższą dawkę MEGAFOL 1,0 L/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungicydami, herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0-3,0 L/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad.

** LECICROP stosować w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i chorobami grzybowymi. Jednocześnie wyrównuje dojrzewanie i wybarwienie, zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wody podczas opadów oraz poprawia właściwości przechowalnicze i transportowe. Stosować w stężeniu 0,3-0,5 %, (300-500 ml na 100 L wody).

*** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie dogłębowe:

VIVA 10L/ha na początku wegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku wegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

RADIFARM 250ml/100 L wody moczenie sadzonek przed posadzeniem, podlewanie po posadzeniu. RADIFARM stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a przez to zdolność rośliny do absorbowania wody i składników odżywczych z gleby.