









NAWOŻENIE I BIOSTYMULACJA ZBÓŻ

 **Kliknij na produkty, aby dowiedzieć się więcej.**

ZIMA		WIOSNA		LATO		WIOSNA	
MEGAFOL 1,0-2,0/ha*	PLANTAFOL 10.54.10 1,0-2,5 kg/ha	Eckosil 0,25-0,5 L/ha	Cuperdem 1,5-2,5 L/ha**	MEGAFOL 1,0-2,0/ha*	PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha	Eckosil 0,25-0,5 L/ha	Cuperdem 1,5-2,5 L/ha**
MEGAFOL 1,0-2,0/ha*	PLANTAFOL 10.54.10 1,0-2,5 kg/ha	Eckosil 0,25-0,5 L/ha	Cuperdem 1,5-2,5 L/ha**	MEGAFOL 1,0-2,0/ha*	PLANTAFOL 20.20.20 2,0-2,5 kg/ha	Eckosil 0,25-0,5 L/ha	Cuperdem 1,5-2,5 L/ha**
							
Wzmocnienie odporności przed zimą, prawidłowy wzrost rośliny. Megafol w celu zwiększenia skuteczności zabiegu i przezwyciężenia stresu roślin po zabiegu herbicydem (zabieg łącznie z herbicydem).	W celu zwiększenia skuteczności zabiegu i przezwyciężenia stresu roślin po zabiegu fungicydem (zabieg łącznie z fungicydem) dodatkowo: ECKOSIL poprawia odporność roślin na choroby, szkodniki i suszę.	Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych. Wspomaganie wzrostu i rozwoju rośliny, poprawa kwitnienia i zawiązywania ziarna.	Poprawa jakości i wielkości plonu. Megafol stosowany w okresie kwitnienia zwiększa zawartość białka, podnosi wielkość plonu i jakość ziarna.	Wzmocnienie odporności przed zimą, prawidłowy wzrost rośliny. Megafol w celu zwiększenia skuteczności zabiegu i przezwyciężenia stresu roślin po zabiegu herbicydem (zabieg łącznie z herbicydem).	W celu zwiększenia skuteczności zabiegu i przezwyciężenia stresu roślin po zabiegu fungicydem (zabieg łącznie z fungicydem) dodatkowo: ECKOSIL poprawia odporność roślin na choroby, szkodniki i suszę.	Zapobieganie wystąpieniu niedoborów składników pokarmowych. Wspomaganie wzrostu i rozwoju rośliny, poprawa kwitnienia i zawiązywania ziarna.	Poprawa jakości i wielkości plonu. Megafol stosowany w okresie kwitnienia zwiększa zawartość białka, podnosi wielkość plonu i jakość ziarna.
Faza 3 liści – początek krzewienia BBC H 3-21	Krzewienie – 1 kolanko BBC H 22-31	2 kolanko co najmniej 2 cm na 1 – liść flagowy BBC H 32-39	Kłoszenie – dojrzałość mleczna BBC H 51-74	Faza 3 liści – początek krzewienia BBC H 3-21	Krzewienie – 1 kolanko BBC H 22-31	2 kolanko co najmniej 2 cm na 1 – liść flagowy BBC H 32-39	Kłoszenie – dojrzałość mleczna BBC H 51-74

* Niższą dawkę MEGAFOL-u 1,0 l/ha zaleca się przy łącznym stosowaniu z fungicydami, herbicydami, insektycydami i nawozami. MEGAFOL poprawia ich skuteczność i szybkość działania. Wyższą dawkę MEGAFOL-u 2,0/ha stosować w przypadku wystąpienia stresu np. przymrozek, susza, zalanie, uszkodzenia poherbicydowe, grad).

** CUPERDEM jako zabieg zapobiegawczy przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym.

Uzupełniające nawożenie doglebowe:

VIVA 10L/ha na początku wegetacji (minimum 500L wody na hektar).

HUMIFLOW 10-20L/ha na początku wegetacji. Dawkę 10L zastosować dwukrotnie.

RADIFRAM zaprawianie nasion.